

## ENRAIZAL “EFECTO BOOSTER” Bioestimulante radicular

### RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos Libres:	4,20% p/p = 4,83% p/v
Nitrógeno Total (N):	6,00% p/p = 6,90% p/v
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ):	2,00% p/p = 2,30% p/v
Potasio (K <sub>2</sub> O):	4,00% p/p = 4,60% p/v
Boro (B):	0,01% p/p = 0,01% p/v
Manganeso (Mn):	0,05% p/p = 0,06% p/v
Cinc (Zn):	0,05% p/p = 0,06% p/v
Líquido Soluble (L.S.)	

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

ENRAIZAL es un Bioestimulante a base de Aminoácidos enriquecidos con NPK, Boro, Manganeso y Cinc. Además contiene derivados de bases púricas y pirimidínicas que le confieren actividad bioestimulante, aplicado después del trasplante favorecen el desarrollo radicular y la micorrización. Su carácter ácido produce un desbloqueo de nutrientes, efecto potenciado por el poder complejante de sus aminoácidos.

ENRAIZAL esta recomendado aplicarlo desde el trasplante o cuando sea conveniente favorecer el enraizamiento, también tiene un efecto positivo ante situaciones desfavorables (sequía, heladas, estados carenciales, pedrisco,...) o cuando sea necesario potenciar el crecimiento y desarrollo del cultivo en los primeros estadios.

### CULTIVOS

ENRAIZAL está recomendado para todo tipo de cultivos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales y Cultivos ornamentales.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIS

ENRAIZAL por su fórmula totalmente asimilable puede ser aplicado vía foliar o radicular mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: Foliar: 200 - 400 cc/100 litros de agua. Radicular: 2-4 L/Ha y aplicación y aplicación hasta completar 10-15L/Ha y ciclo de cultivo.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	Aplicación Radicular	Aplicación Foliar	
Hortícolas invernadero	2-4 L/Ha	200-300 cc /100L	Aplicaciones desde primeras flores, cada 10-15 días
Hortícolas campo abierto	2-4 L/Ha	250-350 cc /100L	Aplicaciones desde primeras flores, cada 10-15 días
Cítricos y Cultivos subtropicales	4-5 L/Ha	250-400 cc /100L	2-3 aplicaciones, desde brotación
Frutales, Olivo y viña	4-5 L/Ha	250-400 cc /100L	2-3 aplicaciones, desde brotación
Cereales y ornamentales	--	200-300 cc /100L	Aplicaciones desde trasplante, cada 10-15 días

### INCOMPATIBILIDADES

ENRAIZAL es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, azufres ni caldos cúpricos, excepto en olivo, en el que la mezcla con compuestos cúpricos puede ser aconsejable No aplicar sobre ciruelos y flor cortada.