

## +PROD

“Aumenta la producción, mejora la calidad”

[www.masprod.net](http://www.masprod.net)

### RIQUEZAS GARANTIZADAS

Cobre (Cu):	1,80% p/p = 2,25% p/v
Manganeso (Mn):	0,80% p/p = 1,00% p/v
Cinc (Zn):	0,60% p/p = 0,75% p/v
Líquido Soluble (L.S.)	

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

+PROD es un Bioestimulante a base de compuestos orgánicos naturales, microelementos y combustibles metabólicos que favorecen la generación y el transporte de los fotoasimilados necesarios para la producción. Se recomienda aplicar +PROD desde el inicio y de forma regular para aumentar la producción y mejorar la calidad de los cultivos (precocidad, tamaño y color homogéneo, mayor vida postcosecha...).

### CULTIVOS

+PROD está recomendado para todo tipo de cultivos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales y Cultivos

ornamentales. Así como en viveros y semilleros. Cuando se inicia la maduración de los frutos y en flor cortada es conveniente aplicarlo en fertirrigación y no vía foliar.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIS

+PROD, por su fórmula totalmente asimilable, puede ser aplicado vía foliar o radicular mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: Foliar: 250 – 500 cc/100 litros de agua. Radicular: 5 L/Ha y aplicación hasta completar 15 – 25 L/Ha y ciclo de cultivo.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	Aplicación Radicular	Aplicación Foliar	
Hortícolas de fruto	2,5 L/Ha y aplicación	200-250 cc /100L y aplicación	1ª aplicación tras el primer cuaje Repetir cada 10 – 15 días
Hortícolas de hoja	2,5 L/Ha y aplicación	200-300 cc /100L y aplicación	Desde el trasplante Repetir cada 10 – 15 días
Cítricos y Cultivos subtropicales	5 L/Ha y aplicación	250-500 cc /100L y aplicación	2 – 3 aplicaciones Brotación, pre-floración y engorde
Frutales, Olivo y viña	5 L/Ha y aplicación	250-500 cc /100L y aplicación	2 – 3 aplicaciones Brotación, pre-floración y engorde
Flores	2-3 L/Ha y aplicación	250-500 cc /100L y aplicación	Desde el trasplante Repetir cada 20 – 25 días
Hidroponía	1-2 L/Ha y aplicación	100-200 cc /100L y aplicación	1ª aplicación tras el primer cuaje Repetir cada 10 – 15 días

**NOTA:** La dosis debe ser establecida en cada caso por el servicio técnico de acuerdo con los requerimientos del cultivo y el tipo de suelo.

### INCOMPATIBILIDADES

+PROD es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales.