

## ENRAIZAL

### Inductor de enraizamiento – Efecto “Booster”

| <b>RIQUEZAS GARANTIZADAS:</b>                                                                            | <b>% p/p</b> | <b>% p/v</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Aminoácidos libres:                                                                                      | 4,20         | 4,83         |
| Nitrógeno total (N):                                                                                     | 6,00         | 6,90         |
| Nitrógeno orgánico:                                                                                      | 0,82         | 0,94         |
| Nitrógeno nítrico:                                                                                       | 0,95         | 1,09         |
| Nitrógeno ureico:                                                                                        | 4,23         | 4,86         |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en agua:                                                | 2,00         | 2,30         |
| Potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua:                                                              | 4,00         | 4,60         |
| Contiene además ≤ 0.1% p/p:<br>Boro (B); Manganeseo (Mn) y Cinc (Zn)                                     |              |              |
| Aminoácidos presentes:<br>ASP-VAL-GLU-PHE-SER-ILE-GLY (3%)-LEU-THR-LYS- (1%)-ARG-<br>HIS-ALA-PRO-TYR-MET |              |              |



**pH= 5,0**  
**1 l = 1,15 kg.**



## Propiedades

**ENRAIZAL** es un producto a base de Aminoácidos enriquecidos con NPK y micronutrientes. Contiene derivados de bases púricas que le confieren actividad enraizante; aplicado después del trasplante favorece el desarrollo radicular y la micorrización.

Se recomienda su aplicación desde el trasplante y/o cuando sea conveniente favorecer el enraizamiento; también tiene un efecto positivo ante situaciones desfavorables (sequía, heladas, estados carenciales, pedrisco, ...) o cuando sea necesario potenciar el crecimiento y desarrollo del cultivo en los primeros estadios.

## Cultivos

**ENRAIZAL** recomendado para todo tipo de cultivos: frutales (de pepita y hueso), cítricos, hortalizas, extensivos y ornamentales.

## Dosis y modo de empleo

Aplicación vía radicular y/o foliar.

Dosis generales de aplicación:

**Foliar:** 2 – 4 l/ha y aplicación.

**Radicular:** 2.5 – 5 l/ha y aplicación.

| CULTIVO                                                                                                               | DOSIS l/ha |           | APLICACIONES / FRECUENCIA                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Foliar     | Radicular |                                                                      |
|  Hortalizas de fruto               | 2 - 4      | 2,5 - 5   | 5 - 10 días tras el trasplante y 10 - 15 días después del trasplante |
|  Hortalizas de hoja                | 2 - 4      | 2,5 - 5   | 5 - 10 días tras el trasplante y 10 - 15 días después del trasplante |
|  Cítricos y cultivos subtropicales | 2,5 - 4    | 2,5 - 5   | 1 - 2 aplicaciones en prefloración                                   |
|  Frutales, olivo y viña            | 2,5 - 4    | 2,5 - 5   | 1 - 2 aplicaciones en prefloración                                   |
|  Extensivos y ornamentales         | 1 - 1,5    | ----      | 1 - 2 aplicaciones desde trasplante                                  |

## Compatibilidades

**ENRAIZAL** es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, azufres ni caldos cúpricos, excepto en olivo, en el que la mezcla con compuestos cúpricos puede ser aconsejable. No aplicar sobre ciruelos y flor cortada.